

# Математический анализ. Лекция XLIV

## Неявные функции

Трушин Борис Викторович

(Московский физико-технический институт)

14 мая 2014 г.

Рассмотрим уравнение  $F(x, y) = 0$ , где  $F$  – функция двух переменных  $x, y$ .

## Определение

Функция  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $X \subset \mathbb{R}$ , называется *неявной* функцией, определяемой уравнением  $F(x, y) = 0$ , если

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in X.$$

Если же на некотором множестве  $E \subset \mathbb{R}^2$  уравнения  $F(x, y) = 0$  и  $y = f(x)$  эквивалентны, то говорят, что *уравнение  $F(x, y) = 0$  разрешимо на  $E$  относительно переменного  $y$* .

## Теорема

Пусть функция  $F$  двух переменных  $x$  и  $y$ .  $F(x_0, y_0) = 0$  и

- 1  $F$  непрерывна на некоторой окрестности  $U(x_0, y_0)$ ;
- 2  $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$  и сохраняет знак на некоторой окрестности  $U(x_0, y_0)$ .

Тогда существует прямоугольная окрестность  $Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0) = Q_\delta(x_0) \times Q_\varepsilon(y_0)$  точки  $(x_0, y_0)$  такая, что на ней

$$F(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x),$$

где функция  $f : Q_\delta(x_0) \rightarrow Q_\varepsilon(y_0)$  непрерывна на  $Q_\delta(x_0)$ ,  $f(x_0) = y_0$ .

## Теорема

Пусть функция  $F$  двух переменных  $x$  и  $y$ .  $F(x_0, y_0) = 0$  и

- 1  $F$  непрерывна на некоторой окрестности  $U(x_0, y_0)$ ;
- 2  $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$  и сохраняет знак на некоторой окрестности  $U(x_0, y_0)$ .

Тогда существует прямоугольная окрестность  $Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0) = Q_\delta(x_0) \times Q_\varepsilon(y_0)$  точки  $(x_0, y_0)$  такая, что на ней

$$F(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x),$$

где функция  $f : Q_\delta(x_0) \rightarrow Q_\varepsilon(y_0)$  непрерывна на  $Q_\delta(x_0)$ ,  $f(x_0) = y_0$ .

Если дополнительно считать, что  $F$  дифференцируема в точке  $(x_0, y_0)$ , то  $f$  дифференцируема в точке  $x_0$  и  $f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$ .

## Теорема

Пусть функция  $F$  двух переменных  $x$  и  $y$ .  $F(x_0, y_0) = 0$  и

- 1  $F$  непрерывна на некоторой окрестности  $U(x_0, y_0)$ ;
- 2  $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$  и сохраняет знак на некоторой окрестности  $U(x_0, y_0)$ .

Тогда существует прямоугольная окрестность  $Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0) = Q_\delta(x_0) \times Q_\varepsilon(y_0)$  точки  $(x_0, y_0)$  такая, что на ней

$$F(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x),$$

где функция  $f : Q_\delta(x_0) \rightarrow Q_\varepsilon(y_0)$  непрерывна на  $Q_\delta(x_0)$ ,  $f(x_0) = y_0$ .

Если дополнительно считать, что  $F$  дифференцируема в точке  $(x_0, y_0)$ , то  $f$  дифференцируема в точке  $x_0$  и  $f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$ .

Если же при этом частные производные  $F'_x, F'_y$  непрерывны на  $U(x_0, y_0)$ , то производная  $f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$  непрерывна на  $Q_\delta(x_0)$ .

**Доказательство.** Пусть  $\sigma, \varepsilon > 0$  настолько малы, что в замыкании прямоугольной окрестности  $Q_{\sigma, \varepsilon}(x_0, y_0)$  функция  $F$  непрерывна, а  $F'_y$  сохраняет знак. Будем считать, что  $F'_y > 0$  на  $Q_{\sigma, \varepsilon}(x_0, y_0)$ . Поэтому  $F(x, y)$  при каждом фиксированном  $x \in Q_\sigma(x_0)$  как функция переменного  $y$  строго возрастает на отрезке  $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ .

**Доказательство.** Пусть  $\sigma, \varepsilon > 0$  настолько малы, что в замыкании прямоугольной окрестности  $Q_{\sigma, \varepsilon}(x_0, y_0)$  функция  $F$  непрерывна, а  $F'_y$  сохраняет знак. Будем считать, что  $F'_y > 0$  на  $Q_{\sigma, \varepsilon}(x_0, y_0)$ . Поэтому  $F(x, y)$  при каждом фиксированном  $x \in Q_\sigma(x_0)$  как функция переменного  $y$  строго возрастает на отрезке  $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ . Отсюда следует (поскольку  $F(x_0, y_0) = 0$ ), что

$$F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0, \quad F(x_0, y_0 + \varepsilon) > 0.$$

**Доказательство.** Пусть  $\sigma, \varepsilon > 0$  настолько малы, что в замыкании прямоугольной окрестности  $Q_{\sigma, \varepsilon}(x_0, y_0)$  функция  $F$  непрерывна, а  $F'_y$  сохраняет знак. Будем считать, что  $F'_y > 0$  на  $Q_{\sigma, \varepsilon}(x_0, y_0)$ . Поэтому  $F(x, y)$  при каждом фиксированном  $x \in Q_\sigma(x_0)$  как функция переменного  $y$  строго возрастает на отрезке  $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ . Отсюда следует (поскольку  $F(x_0, y_0) = 0$ ), что

$$F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0, \quad F(x_0, y_0 + \varepsilon) > 0.$$

Функции  $F(x, y_0 - \varepsilon)$ ,  $F(x, y_0 + \varepsilon)$  как функции переменного  $x$  непрерывны на  $Q_\sigma(x_0)$  (и, следовательно, обладают свойством сохранения знака), так что найдется  $\delta \in (0, \sigma]$  такое, что

$$F(x, y_0 - \varepsilon) < 0, \quad F(x, y_0 + \varepsilon) > 0 \quad \forall x \in Q_\delta(x_0).$$



Зафиксируем произвольное значение  $x^* \in Q_\delta(x_0)$ . Поскольку  $F(x^*, y_0 - \varepsilon) < 0$ ,  $F(x^*, y_0 + \varepsilon) > 0$ , то по теореме Коши о промежуточном значении непрерывной функции  $F(x^*, y)$  найдется  $y^* \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ , при котором  $F(x^*, y^*) = 0$ . Такое значение  $y^*$  единственно в силу строгой монотонности функции  $F(x^*, y)$ . Обозначим  $y^* = f(x^*)$ . Таким образом, построена функция  $f: Q_\delta(x_0) \rightarrow Q_\varepsilon(y_0)$  такая, что  $f(x_0) = y_0$ ,

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x) \text{ на } Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0).$$

Из последнего соотношения получаем, что  $F(x, f(x)) = 0$  при  $x \in Q_\delta(x_0)$ . Установим непрерывность функции  $f$  на  $Q_\delta(x_0)$ . Непрерывность  $f$  в точке  $x_0$  следует из того, что в приведенных построениях число  $\varepsilon > 0$  можно считать сколь угодно малым, причем для каждого достаточно малого  $\varepsilon > 0$  было указано  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  такое, что  $f(Q_\delta(x_0)) \subset Q_\varepsilon(y_0) = Q_\varepsilon(f(x_0))$ . Пусть теперь  $x^*$  – произвольная точка из  $Q_\delta(x_0)$ ,  $y^* = f(x^*)$ . Условия теоремы выполняются после замены в них  $(x_0, y_0)$  на  $(x^*, y^*)$ . Следовательно, по уже доказанному,  $f$  непрерывна в точке  $x^*$ .

Предположим теперь, что  $F$  дифференцируема в точке  $(x_0, y_0)$ . В силу дифференцируемости функции  $F$

$$\begin{aligned} F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0) &= \\ &= F'_x(x_0, y_0)\Delta x + F'_y(x_0, y_0)\Delta y + \\ &+ \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)\Delta y, \end{aligned}$$

где  $\varepsilon_i(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$  при  $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ ,  $i = 1, 2$ . Здесь будем считать  $|\Delta x|$  достаточно малым,  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$ , так что  $y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$ .

Тогда получаем

$$\begin{aligned} 0 &= F'_x(x_0, y_0)\Delta x + F'_y(x_0, y_0)\Delta y + \\ &+ \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)\Delta y. \end{aligned}$$

Так как  $|\Delta x|$ , а значит, и  $|\Delta y| = |\Delta f|$  достаточно малы, имеем

$$\Delta y = \frac{F'_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)}{F'_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)} \Delta x = \frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} \Delta x + o(\Delta x)$$

при  $\Delta x \rightarrow 0$ . Следовательно, функция  $f$  дифференцируема в точке  $x_0$  и

$$f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} = -\frac{F'_x(x_0, f(x_0))}{F'_y(x_0, f(x_0))}.$$

Если функция  $F$  дифференцируема не только в точке  $(x_0, y_0)$ , но и на окрестности  $Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0)$ , то последняя формула верна для любого  $x \in Q_\delta(x_0)$ :

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))} \quad \forall x \in Q_\delta(x_0).$$

Из этой формулы вытекает последнее утверждение теоремы.

Обобщим теорему на случай неявной функции, заданной уравнением  $F(x_1, \dots, x_n, y) = 0$ .

Далее будем пользоваться обозначениями:

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}),$$

$$(x, y) = (x_1, \dots, x_n, y), \quad (x^{(0)}, y_0) = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, y_0),$$

$$F(x, y) = F(x_1, \dots, x_n, y).$$

## Теорема

Пусть задана функция  $F(x, y) = F(x_1, \dots, x_n, y)$ .  $F(x^{(0)}, y_0) = 0$  и

- 1  $F$  непрерывна на некоторой окрестности  $U(x^{(0)}, y_0)$  точки  $(x^{(0)}, y_0)$ ;
- 2  $F'_y(x^{(0)}, y_0) \neq 0$ ,  $F'_y$  непрерывна в точке  $(x^{(0)}, y_0)$ .

Тогда существует кубическая окрестность  $Q_\delta(x^{(0)}, y_0)$  точки  $(x^{(0)}, y_0)$  такая, что на ней

$$F(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x),$$

где функция  $f : Q_\delta(x^{(0)}) \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна на  $Q_\delta(x^{(0)})$ ,  $f(x^{(0)}) = y_0$ ,  
 $F(x, f(x)) = 0$  при  $x \in Q_\delta(x^{(0)})$ .

## Теорема

Пусть задана функция  $F(x, y) = F(x_1, \dots, x_n, y)$ .  $F(x^{(0)}, y_0) = 0$  и

- 1  $F$  непрерывна на некоторой окрестности  $U(x^{(0)}, y_0)$  точки  $(x^{(0)}, y_0)$ ;
- 2  $F'_y(x^{(0)}, y_0) \neq 0$ ,  $F'_y$  непрерывна в точке  $(x^{(0)}, y_0)$ .

Тогда существует кубическая окрестность  $Q_\delta(x^{(0)}, y_0)$  точки  $(x^{(0)}, y_0)$  такая, что на ней

$$F(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x),$$

где функция  $f : Q_\delta(x^{(0)}) \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна на  $Q_\delta(x^{(0)})$ ,  $f(x^{(0)}) = y_0$ ,  
 $F(x, f(x)) = 0$  при  $x \in Q_\delta(x^{(0)})$ .

Если дополнительно известно, что  $F$  дифференцируема в точке  $(x^{(0)}, y_0)$ , то

$f$  дифференцируема в точке  $x^{(0)}$  и при  $i = 1, \dots, n$ :  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^{(0)}) = -\frac{F'_{x_i}(x^{(0)}, y_0)}{F'_y(x^{(0)}, y_0)}$ .

## Теорема

Пусть задана функция  $F(x, y) = F(x_1, \dots, x_n, y)$ .  $F(x^{(0)}, y_0) = 0$  и

- 1  $F$  непрерывна на некоторой окрестности  $U(x^{(0)}, y_0)$  точки  $(x^{(0)}, y_0)$ ;
- 2  $F'_y(x^{(0)}, y_0) \neq 0$ ,  $F'_y$  непрерывна в точке  $(x^{(0)}, y_0)$ .

Тогда существует кубическая окрестность  $Q_\delta(x^{(0)}, y_0)$  точки  $(x^{(0)}, y_0)$  такая, что на ней

$$F(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x),$$

где функция  $f : Q_\delta(x^{(0)}) \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна на  $Q_\delta(x^{(0)})$ ,  $f(x^{(0)}) = y_0$ ,  
 $F(x, f(x)) = 0$  при  $x \in Q_\delta(x^{(0)})$ .

Если дополнительно известно, что  $F$  дифференцируема в точке  $(x^{(0)}, y_0)$ , то  $f$  дифференцируема в точке  $x^{(0)}$  и при  $i = 1, \dots, n$ : 
$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^{(0)}) = -\frac{F'_{x_i}(x^{(0)}, y_0)}{F'_y(x^{(0)}, y_0)}.$$

Если же при этом все частные производные первого порядка функции  $F$  непрерывны на  $U(x^{(0)}, y_0)$ , то при  $i = 1, \dots, n$  производные

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = -\frac{F'_{x_i}(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))} \text{ непрерывны на } Q_\delta(x^{(0)}).$$

**Доказательство** аналогично доказательству предыдущей теоремы.